

服用に際し、この説明書を必ず読むこと。また、必要なとき読めるように大切に保管すること。

ビタミン含有保健薬

第3類医薬品

滋養強壮・栄養補給

# コンクレバン<sup>®</sup>

ニッスイ

## 製品の特徴

コンクレバンは肝臓（レバー）を酵素で分解した肝臓加水分解物や心臓エキスとビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>2</sub>・B<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>を配合した滋養強壮の液剤です。胃腸障害や栄養障害、発熱で体力が消耗している時、いろいろな病気で体力が衰えている時、肉体疲労の時、妊娠中・授乳期などの栄養補給に好適です。



## 使用上の注意



## 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書をもって医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書をもって医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

## 効能効果

滋養強壮。

虚弱体質。

肉体疲労・病後の体力低下・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給。

## 用法用量

通常1日量30mLを2～3回に分けて随時服用する。

（計量には添付の目盛り付きコップを使用ください。数字の単位はmLです。）

## 成分分量 30mL中

成 分	分 量	はたらき
肝臓加水分解物	600mg	新鮮な肝臓（レバー）を加水分解したアミノ酸が主成分で、肝機能などを高め、疲れたカラダに栄養を送ります。
心臓エキス	300mg	心臓などのカラダの機能を高めます。
チアミンジスルフィド（ビタミンB <sub>1</sub> ）	13.5mg	糖質や脂質、たんぱく質の代謝に関与し、栄養素を効率よくはたらかせるビタミンです。
リボフラビン（ビタミンB <sub>2</sub> ）	3mg	
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB <sub>6</sub> ）	3mg	
シアノコバラミン（ビタミンB <sub>12</sub> ）	30μg	赤血球などの新生を助けたり、神経細胞にはたらくビタミンです。

添加物としてクエン酸水和物、パラベン、プロピレングリコール、pH調節剤、香料、ハチミツ、白糖、ブドウ糖、カラメルを含有する。

〈成分分量に関連する注意〉

尿を黄変させることがある。

## コンクレバンはこんな方に役立つお薬です。

かぜをひいて発熱した時、またその他、病気にかかった時など、体力の消耗が激しくなります。体力を回復するには、体を休めるとともに栄養補給が大切です。各種アミノ酸やビタミン類を含んだコンクレバンは、病中病後やかぜなどの発熱性消耗性疾患によって消耗した体力の回復を助けます。

疲れがたまるとう心臓などの内臓や全身の筋肉に多くの負担がかかり、体力を消耗します。コンクレバンは、肝臓(レバー)を酵素で分解した肝臓加水分解物を中心に、心臓エキス、ビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>2</sub>・B<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>を配合した液剤です。肉体疲労時、いろいろな病気で体力が衰えているときなどの栄養補給に最適です。

病中病後(かぜなど)で  
体力が消耗している方



からだが疲れて  
栄養補給が必要な方



病気がち・体の弱い方



胃腸が弱っている方



私たちの体の臓器・筋肉・血液等は、常に新しく作り変えられています。そのため、体を維持するのに必要なアミノ酸をはじめとする各種の栄養素の補給が必要不可欠です。小さい時から体が弱く病気がち、体力がなく疲れやすい、食が細いといった虚弱体質の方は、特にバランスのとれた栄養補給と適度な運動によって丈夫な体をつくるのが大切です。コンクレバンがお役に立ちます。

コンクレバンに含有されている肝臓加水分解物は、酵素分解されたアミノ酸が主成分で、胃腸が弱っているときでも負担をかけません。胃腸が弱ると栄養素の吸収が悪くなるのがしばしばありますが、コンクレバンにはアミノ酸やビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>2</sub>・B<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>が含まれ、また服用しやすい液剤ですので、不足しがちな栄養素の補給も無理なくできます。胃腸障害のある方の栄養補給に最適です。

### 保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
4. 開栓後はフタをしっかりとしめ、冷蔵庫に立てて保管すること。
5. 雑菌などの汚染の恐れがあるので、ピンの口に直接口をつけて服用したり、目盛り付きコップに入れたものをビンに戻さないこと。
6. 品質保持の点から、開栓後3週間以内に服用すること。
7. 服用途中、味・においなどに変化があり異常を感じた場合には、直ちに服用を中止すること。
8. ビンの口、目盛り付きコップは清潔に保つこと。
9. 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

### 【問い合わせ先】

1. 購入した薬局・薬店
2. 日水製薬株式会社 お客様相談窓口 電話：03-3837-0987  
受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時  
(土・日・祝日を除く)

製造販売元



日水製薬株式会社  
東京都台東区上野3-23-9

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎0120-149-931